

106 學年度第 1 學期北區十七所技專校院聯合招收

五年制專科各年級轉學生考試

五年級 【護理學】 准考證號碼：□□□□□□□□

- | | |
|------|--|
| 注意事項 | 1. 本試題共 40 題；每題 2.5 分，合計 100 分。
2. 所有試題都是單選題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個不同選項。
3. 本試題答錯不倒扣。 |
|------|--|

- 有關消化系統檢查之護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A) 接受經皮穿肝膽道攝影檢查前，應了解病人之過敏史
(B) 上腸胃道攝影檢查後 2~3 天的大便為白色是正常現象
(C) 胃鏡檢查結束後，告知病人可立即進食
(D) 胃鏡檢查，檢查前給予 Atropine，其主要目的為減少唾液分泌。
- 下列敘述何者顯示胃食道逆流病人對自我照護認知不足，需加強衛教？
(A) 「吃完飯後，我最好躺下來休息。」
(B) 「睡前 3 小時我最好不要吃東西。」
(C) 「進餐時要細嚼慢嚥，少量多餐。」
(D) 「睡覺時，我最好床頭抬高 4~6 吋」
- 有關大腸癌，下列敘述何者錯誤？
(A) 大部分的大腸癌起源於腺瘤
(B) 發生在左側的大腸癌，常出現貧血之臨床症狀
(C) 行腹會陰切除手術 (abdominal-perineal resection)，會伴隨永久性結腸造瘻口
(D) 有大腸息肉病史者為高危險群。
- 有關肝硬化之敘述，下列何者正確？
(A) 長期酗酒病人易罹患壞死性肝硬化
(B) 肝昏迷病人應採低蛋白飲食
(C) 肝性腦病變病人應使用鎮定劑，以穩定情緒
(D) 因賀爾蒙代謝異常，臨床表徵包含男性女乳症及睪丸腫脹、蜘蛛狀血管瘤。
- 根據血氧分析結果：pH 7.32、PaCO₂ 32 mmHg、HCO₃ 18 mEq/L、PaO₂ 86 mmHg，病人最可能發生下列何種情形？
(A) 呼吸性鹼中毒 (B) 呼吸性酸中毒 (C) 代謝性鹼中毒 (D) 代謝性酸中毒。
- 有關脫離呼吸器失敗指標的敘述，下列何者正確？
(A) pH < 7.45，PaO₂ > 80 mmHg (B) 脈搏速率 < 100 次／分
(C) 呼吸速率 10~20 次／分 (D) 每次潮氣容積低於 250 c.c.。
- 顱內壓升高會出現的臨床表徵，下列何者正確？①頭痛 ②脈搏壓變窄 ③血壓下降 ④心跳變慢：(A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④。

- 正在接受治療的開放性肺結核病人，下列何指標表示中止空氣傳染防護措施？
(A) 胸部 X 光顯示肺結核已痊癒
(B) 持續按時服用肺結核藥物達 6 個月
(C) 連續 2 次以上痰液的抗酸菌(acid-fast bacilli)抹片檢體均為陰性反應
(D) 連續 2 次皮膚試驗(PPD)為陽性反應。
- 有關慢性阻塞性肺部疾病病人之氧氣療法，下列何者錯誤？
(A) 氧氣治療有助降低肺血管阻力 (B) 可以使用凡德里面罩 (Venturi's mask) 給氧
(C) 每分鐘給予 5~6 升流速之氧氣 (D) 維持 SaO₂ ≥ 90%。
- 氣喘患者之肺功能測量結果，下列何者正確？
(A) 功能性肺餘量 (FRC) 下降 (B) 尖峰吐氣流速 (PEFR) 下降
(C) 用力呼吸流速 (FEF25~75%) 增加 (D) 第一秒用力呼氣容積 (FEV₁) 增加。
- 有關肺癌之敘述，下列何者正確？
(A) 大細胞肺癌對化學治療的敏感性較高 (B) 鱗狀細胞癌好發於抽菸的女性
(C) 腺癌好發於不抽菸的男性 (D) 小細胞癌生長極迅速，是最惡性的肺癌。
- 由於感染所造成之肋膜積水，下列何者正確？
(A) 為漏出性 (transudative) 肋膜積水 (B) 液顏色較深、內含蛋白質 > 3gm/dL
(C) 顏色清澈、淡黃 (D) 主要原因為血漿滲透壓下降。
- 頭部外傷病患會自動睜眼，對時間、地點有混亂情形，但能遵循命令做運動。其格拉斯哥昏迷指數(GCS)分數為何？(A) E₄V₄M₆ (B) E₃V₃M₅ (C) E₄V₂M₄ (D) E₃V₄M₅。
- 有關暫時缺血性發作(TIA)之敘述，下列何者錯誤？
(A) 發作時，頸動脈超音波掃描有助確立病因
(B) 中風病人約 25~50% 曾有此病史
(C) 臨床表徵包括視力模糊、一側肢體突然無力、大小便失禁現象
(D) 通常在 24 小時內復原後症狀會完全消失。
- 下列何者是與中風病人溝通最適當的方式？
(A) 以開放式問句鼓勵病人回答
(B) 若病人語言表達有困難時，代替個案說出想說的句子
(C) 當病人表示聽不懂時，應提高音量重複一次
(D) 宜放慢說話速度，必要時併用非語言的溝通方式。
- 有關脊髓損傷後發生自主神經反射過度之表徵，下列何者錯誤？
(A) 血壓升高 (B) 心跳變快 (C) 大量出汗 (D) 豎毛肌痙攣。
- 下列何者非肌肉骨骼系統評估之「6P 徵象」？
(A) pain (B) pink (C) paralysis (D) paresthesia。
- 劉先生因拍戲騎馬跌落造成 S₂~S₄ 完全性脊髓損傷入院，下列敘述何者正確？
(A) 當膀胱脹滿時可藉由反射排空膀胱 (B) 對男性而言可以保存反射性勃起
(C) 會出現溢出性尿失禁 (D) 無法藉由增加腹壓的方式排便。

注意背面尚有試題

19. 汪先生車禍送至急診，電腦斷層掃描檢查診斷為硬腦膜下出血(SDH)，有關術後之護理措施，下列何者錯誤？
(A)床頭抬高 30 度以預防發生顱內高壓(increased intracranial pressure, IICP)
(B)最好採集中護理的方式照護病人
(C)限制水分，並記錄輸出入量
(D)術後病人易產生癲癇抽搐，應隨時拉起床欄預防意外跌下。
20. 有關腰椎椎間盤突出(HIVD)病患日常生活的注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)鼓勵睡硬板床 (B)須長時間站立時，可彎曲一腿以緩解下背部壓力
(C)改坐較低、較軟的沙發 (D)教導執行威廉氏屈曲運動，可強健背部的肌肉。
21. 有關使用藥物控制癲癇發作之敘述，下列何者錯誤？
(A)開始治療時，單獨使用一種高劑量抗痙攣藥物，比同時使用多種低劑量藥物有效
(B)提醒服用 phenytoin(Dilantin)的病患，應注意口腔照護
(C)重積性癲癇的抽搐發作患者，一旦症狀消失，就可停止服藥
(D)病患曾有 2 次以上癲癇發作者，其服用抗痙攣藥物時間要延長至 2～3 年。
22. 下列何者為巴金森氏症病患早期的臨床表徵？
(A)大拇指對手指的搓藥丸動作 (B)肢體僵直，快步行走
(C)記憶力減退 (D)複語症(palilalia)。
23. 糖尿病的診斷標準，下列何者正確？
(A)糖化血色素< 6.0% (B)單次口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）140～200mg/dL
(C)空腹血糖連續兩次≥ 126mg/dL (D)隨意抽血一次血漿葡萄糖≥ 200mg/dL。
24. 新生兒出生後之立即性護理措施，下列順序何者正確？①防止體熱 喪失②建立及維持呼吸道通暢③測量出生體重④出生第一分鐘之阿帕嘉評分(Apgar score)⑤臍帶護理：
(A)②→①→④→⑤→③ (B)①→②→③→④→⑤
(C)③→④→②→⑤→① (D)④→②→⑤→③→①。
25. 接受全髖關節置換患者術後的出院指導，下列何者正確？
(A)坐著時盡量將雙腿交叉 (B)使用加高的馬桶座，以避免髖關節屈曲超過 90 度
(C)返家 2 週內，患肢不可執行等張等長運動 (D)強調半年內不要開車。
26. 下列那些是血液透析的原理？①擴散作用②重力作用③滲透作用④超過濾作用⑤主動運輸：
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)③④⑤。
27. 有關類風溼性關節炎病患關節病變之敘述，下列何者正確？
(A)侵犯單處關節 (B)常呈不對稱性發生
(C)手指關節呈天鵝頸狀 (D)手指腫脹並橈側偏曲。
28. 發燒初期病人會出現下列那一種生理反應？
(A)寒顫 (B)頭痛 (C)皮膚發紅 (D)肌肉關節疼痛。
29. 有關川崎氏症候群症狀的敘述，下列何者錯誤？
(A)發高燒持續五天以上，出現草莓舌 (B)軀幹會出現膿疱
(C)四肢末梢紅腫，手腳掌脫皮 (D)雙眼結膜充血，但無分泌物。

30. 下列何者為最具體的護理目標？
(A)3 天內便秘改善 (B)病人能獲得良好的營養供給
(C)病人體重一個月內增加 0.5 公斤 (D)知道每餐攝取達一定份量的蔬菜的重要性。
31. 有關影響冷熱效用的因素，下列何者正確？
(A)同樣溫度下，濕冷的效果比乾冷好 (B)濕熱使用的溫度以 48℃ 為最高極限
(C)冷熱治療一般以 40～60 分鐘為限 (D)男性對冷熱的反應比女性敏感。
32. 使用病人自控式疼痛法(PCA)控制疼痛時，護理人員應特別觀察下列何項生命徵象的變化？(A)體溫 (B)呼吸 (C)脈搏 (D)血壓。
33. 給藥時須遵守三讀五對原則，所謂「三讀」包含下列何者？①由藥車取出藥瓶或藥袋時 ②由藥瓶或藥袋取出藥物時 ③將藥瓶或藥袋放回藥車時 ④將藥物拿給病人服用時：
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④。
34. 有關腦性麻痺之敘述，下列何者錯誤？
(A)病童都會有智障的問題 (B)為長時間的腦部缺氧所造成的腦部損傷
(C)最常見的是痙攣型的腦性麻痺 (D)單側輕偏癱的運動缺陷通常發生在上肢。
35. 陳女士子宮頸口開 10 公分，出現那些徵兆時，代表已經進入第二產程？①有便意感②現血量突然增加③胎心率加速④會陰膨出⑤胎心率週期性加速：
(A)①②③ (B)①②④ (C)①②⑤ (D)②③⑤。
36. 王太太為 B 型肝炎帶原者〔HbeAg(+)〕，自然生產一女嬰。下列相關敘述，何者正確？
(A)怕傳染給嬰兒，故不可以餵母乳 (B)新生兒 24 小時內需注射免疫球蛋白
(C)需將母親和嬰兒分開隔離 (D)新生兒只需接種 B 型肝炎疫苗即可。
37. 下列有關產後生殖系統的正常變化，何者敘述正確？
(A)分娩後惡露約持續 10 天，呈鮮紅色，並有血塊流出
(B)產後 12 小時子宮底位置會在臍上一橫指或臍平的位置
(C)產後約第 3 天，子宮即下降至骨盆腔
(D)子宮約在產後 4 週，便可恢復到懷孕前的大小和形狀。
38. 黃太太 5 年前結婚，目前妊娠 28 週，有 1 個女兒及 1 對雙胞胎，曾於妊娠 8 週自然流產 1 次，孕產史的記錄為：
(A)G₄P₂A₁ (B)G₃P₃A₁ (C)G₄P₃A₁ (D)G₃P₂A₁。
39. 待產時 Pitocin 使用之監測，下列何者正確？
(A)開始用藥的劑量為每分鐘 10 IU/MI (B)2～3 分鐘宮縮一次才可使用
(C)間歇性使用胎兒監測器 (D)胎心率於 100 bpm 時應停止給藥
40. 有關子癇前症之護理措施，下列何項錯誤？
(A)症狀嚴重者應入住加護病房，並提供聲光刺激以防痙攣發生
(B)應給予均衡之高蛋白低鈉飲食之衛教
(C)應密切注意子癇前症婦女生命徵象、水腫及胎動情形
(D)血壓控制在 140～150／90～100 mmHg 之間。